

# MATHÉMATIQUES

*Temps à disposition : 4 heures*

*Note maximale (6) pour 5 problèmes justes*

*Fascicule "Extrait des formulaires et tables" à disposition*

*Machine à calculer non graphique et non programmable autorisée*

## Problème 1

Étudier, puis représenter (unité : 1 cm) la courbe d'équations paramétriques

$$x(t) = \frac{t^2}{t+1} \quad \text{et} \quad y(t) = \frac{t^3}{t+1}.$$

## Problème 2

On considère le triangle de sommets  $A(21; 4; 18)$ ,  $B(5; 12; 2)$  et  $C(1; 20; 10)$ .

2.1 Prouver que le triangle  $ABC$  est rectangle en  $B$ .

La rotation de ce triangle autour de l'axe  $(AB)$  engendre un cône  $\gamma$ .

2.2 Écrire l'équation cartésienne du plan  $\pi$  contenant la base du cône  $\gamma$ .

2.3 Calculer l'angle que forme la génératrice  $(AC)$  avec le plan  $\pi$ .

2.4 Calculer le volume du cône  $\gamma$ .

2.5 Écrire une représentation paramétrique de la droite  $t$  contenue dans le plan  $\pi$  et tangente au cône  $\gamma$  au point  $C$ .

2.6 Écrire l'équation cartésienne de la sphère circonscrite au cône  $\gamma$ .

## Problème 3

a) Soit  $h$  un endomorphisme de  $\mathbf{R}^2$  qui correspond géométriquement à une symétrie orthogonale d'axe la droite d'équation  $y = ax$ . Dans la base canonique  $(e_1, e_2)$ , on donne les vecteurs  $v_1 = (1; a)$  et  $v_2 = (a; -1)$ .

1) Les vecteurs  $v_1$  et  $v_2$  sont deux vecteurs propres de  $h$ . Justifier.

2) Écrire la matrice  $H'$  de  $h$  dans la base  $(v_1, v_2)$ .

3) Pour  $a = 2$ , déterminer la matrice  $H$  de  $h$  dans la base canonique.

b) Soit la fonction complexe

$$f(z) = \frac{iz + 2}{z - i}.$$

1) Déterminer les points fixes de la fonction  $f$ .

2) Déterminer  $f(x + yi)$  sous forme cartésienne.

3) Déterminer l'ensemble des points  $z$  dont l'image  $f(z)$  est purement réelle.

#### Problème 4

Un billard comporte six trous permettant de gagner respectivement 100, 75, 75, 75, 50 et 50 points.

Une partie consiste à lancer successivement trois boules. Chaque boule lancée se place dans un trou et il ne peut pas y avoir plus d'une boule par trou. On suppose que, pour chaque boule, il y a équiprobabilité de se placer dans l'un des trous encore vides.

Chaque boule rapporte le nombre de points correspondant au trou qu'elle occupe.

a) Une personne joue une partie. Calculer la probabilité des événements suivants :

A : les trois boules rapportent chacune 75 points

B : la somme des points obtenus vaut 225

C : une des boules rapporte 100 points sachant que la somme des points obtenus vaut 200.

b) Calculer la moyenne de la somme des points obtenus lors d'une partie.

c) Dix personnes jouent chacune une partie. Calculer la probabilité des événements suivants :

D : quatre personnes obtiennent un total de 250 points

E : au moins une personne obtient un total de 250 points

F : cinq personnes obtiennent un total de 225 points et deux personnes un total de 250 points.

d) Une personne joue 1000 parties. Calculer une valeur approximative de la probabilité que le nombre de parties donnant un total de 250 points soit compris entre 140 et 165 (bornes incluses).

#### Problème 5


a) Soit l'équation différentielle suivante :

$$xy' - 2y = x^3 e^{-x}$$

1) Déterminer la solution générale de cette équation.

2) Déterminer la solution particulière de cette équation qui possède un point à tangente horizontale d'abscisse  $x = 1$ .

b) Soit la fonction  $f(x) = xe^{-x}$  (qui n'est pas la solution de l'équation différentielle ci-dessus). Soit  $C$  le graphe de  $f$  représenté ci-dessous.



1) Soit  $D$  le domaine délimité par l'axe  $Ox$ , la courbe  $C$  et la verticale  $x = t$ ,  $t > 0$ .

– Calculer l'aire  $S(t)$  du domaine  $D$ .

– Calculer la limite de  $S(t)$  lorsque  $t$  tend vers  $+\infty$ .

2) Soit le point  $P$  d'abscisse  $x > 0$  qui appartient à la courbe  $C$ , et  $P'$  la projection orthogonale de  $P$  sur l'axe  $Ox$ . Pour quelle valeur de  $x$  l'aire du triangle  $OPP'$  est-elle maximale ?